

Диагноз: Ювенильный идиопатический артрит (лечение метотрексатом, НПВП, генноинженерными препаратами)

Кратность наблюдения специалистами		месяц											
Консультация педиатра	1 раз в 6 месяца												
Консультация ревматолога	Не реже 1 раза в 6 мес.												
Консультация офтальмолога	1 раз в 6 месяцев												
Консультация отоларинголога	1-2 раза в год												
Консультация ортопеда													
Консультация стоматолога													
Консультация невролога													
Объем обследования (по рекомендации ревматолога)													
Контроль ОАК	1 раз в 2 недели												
Биохимическое исследование крови (общий белок, белковые фракции, мочевины, креатинин, билирубин, калий, натрий, ионизированный кальций, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза)	1 раз в 2 недели												
ОАМ	1 раз в мес.												
Анализ иммунологических показателей (концентрация IgA, IgM, IgG, СРБ, РФ, АЦЦП, АНФ, антистрептолизина-О)	1 раз в 6 мес.												
ЭКГ	1 раз в 3 месяца												
УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек	1 раз в 6 месяцев												
Рентгенография суставов	1-2 раза в год												
Рентгенография органов грудной клетки	1 раз в год												
Больным, получающим НПВП и ГК, для исключения эрозивных, язвенных процессов и гастропатий, проводят ФЭГДС с биопсией слизистой оболочки желудка с последующим тестированием на H. pylori и морфологическим исследованием	1 раз в год или по показаниям												
Вакцинация	кроме использования живых вакцин - по заключению аллерголога-иммунолога												
В период полной ремиссии, по индивидуальному плану после консультации с ревматологом													

Дети с установленным диагнозом ЮИА с диспансерного учета не снимаются, наблюдаются до перевода в терапевтическую сеть по достижении 18-летнего возраста